[illegible]

【规格】 50mg。

【用法用量】 阴道给药，每次1粒，每日1~2次，月经期停用3~4天，3~6个月为一疗程，或遵医嘱。

【不良反应】偶有外阴瘙痒或轻度体重增加。

口服制剂曾有下列不良反应：

雄激素样作用，包括体重增加，痤疮、皮脂溢出，轻度的多毛症、水肿、脱发、声音改变，如音调嘶哑、不稳定、低沉，停药后可持续，阴蒂增生罕见。其它可能的内分泌作用，包括月经周期改变，闭经，停[illegible]

潮红、出汗、阴道干燥、刺激感和乳房减小、反映雌激素下降。精神和情绪不安已有报道。

有报道每天400mg或更高剂量，引起血清转氨酶升高或黄疸性肝功能损害，故口服治疗[illegible]

[illegible]实验室检查异常，包括CPK，葡萄糖耐量、糖原、甲状腺结合球蛋白、性激素结合球蛋白。

【禁忌】 下列患者禁用本品：

1. 诊断不明的阴道异常出血患者。
2. 肝、肾、心功能明显损害患者。
3. 孕妇及哺乳期妇女。
4. 卟啉症患者。
5. 血栓病患者。
6. 雄激素依赖性肿瘤患者 。

【注意事项】

[illegible]生成素的分泌和释放，并通过与生殖激素受体结合，在性腺靶器官部位产生直接抑制作用。

【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮藏】遮光，密封，阴凉处保存（不超过20℃）。

【包装】

1. 铝塑(药品包装用铝箔，聚氯乙烯固体药用硬片)包装。每盒1板，每板6粒。
2. 双塑(聚氯乙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合硬片)包装。每盒1板，每板6粒。
[illegible]塑(聚氯乙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合硬片)包装。每盒3板，每板6粒。

【有效期】24个月。

【执行标准】WS₁-（X-022）-2007Z

[illegible]

药品上市许可持有人及生产企业名称：江苏联环药业股份有限公司

药品上市许可持有人及生产企业地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号

邮政编码：225127
电话号码：0514-87814842
传真号码：0514-87815079
网　　址：www.lhpharma.com