

本品开封后，在每周用约1次的情况下最多可连续使用8周共计9次，请严格按照要求注射和保存。

各类神经系统疾病	头晕、头痛	良性颅内压升高
胆碱酯酶	胆碱酯酶、胆碱酯酶抑制剂	

血值和尿高素敏感；生长激素治疗可能降低尿高素敏感性，尤其在使用高剂量时，尿高素分泌不足，患者可能出现反常性低糖。其前所述，断的感，耐重受累及糖尿病可能会在本品治疗期间出现。患者在生长激素治疗期间，应定期监测尿糖和血糖水平，必要时需调整胰岛素剂量。

目前臨床之本品多系患者用初的安妥性及其有效性研究則和「**【結構相似作用】**」
 糖皮质激素會抑制本品的促生長作用，因而接受生長

与空白对照相比, 模型组大鼠血清总胆固醇(TC)和甘油三酯(TG)水平均显著升高($P < 0.05$), 而高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平显著降低($P < 0.05$), 提示模型组大鼠血脂代谢紊乱。与空白对照相比, 模型组大鼠血清总胆固醇(TC)和甘油三酯(TG)水平均显著升高($P < 0.05$), 而高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平显著降低($P < 0.05$), 提示模型组大鼠血脂代谢紊乱。